



藥物資訊

ATAZANAVIR (Reyataz)

為什麼醫生處方ATAZANAVIR這種藥物給我？

- ATAZANAVIR這種藥物通常是與其他藥物組合起來服用的，用來醫治愛滋病的感染。
- ATAZANAVIR屬於名為 PROTEASE INHIBITOR (PI) 類型的藥物，他可以阻隔一種名為“PROTEASE”的蛋白質，愛滋病毒需要這種蛋白質才能夠繁殖。故此，藥物阻隔了這種蛋白質就有助於舒緩愛滋病的病情。
- 服食這種藥物可以降低你身體內的愛滋病毒的數量，也可以減低與愛滋病有關的感染的機會，幫助你康復及保持身體健康，這種藥物也可以減少愛滋病毒對免疫系統的損害。

如何正確服用這種藥物？

- ATAZANAVIR為150 毫克及200毫克的膠囊。
- 如果ATAZANAVIR作為唯一的 PROTEASE INHIBITOR藥物，其常用劑量為 400毫克 (2 X 200毫克膠囊)，每天服食一次。它也可以組合其他PI 的藥物一起服食，通常是 RITONAVIR，服用量為 ATAZANAVIR 300毫克，RITONAVIR 100 毫克，每天服食一次。
- ATAZANAVIR應與食物一起服食。
- ATAZANAVIR存放在室溫和乾爽的地方，不要將藥物存放在浴室或廚房，因為空氣中的水分會令藥物失去效力。
- 將藥物存放在兒童不能拿到的地方。

如果我忘記了服藥怎麼辦？

- 應該儘快補服，但若發覺時距離下一次服藥時間少於兩小時的話，就應該按照預定的時間服食下一劑，不可一次服用兩劑，以免過量。
- 近期研究結果指出，抗愛滋病的藥物必須嚴加執行按照規定的時間表和劑量內服用才能產生理想的效果。如果忘記或不按時服藥，愛滋病毒可能會對藥物產生抵抗力，從而降低藥物的效力。

可能引起的副作用：

- 最常見的副作用包括頭痛，噁心，紅斑，腹痛及皮膚或眼白發黃(黃疸病)。
- 患有乙型或丙型肝炎的患者由可能會加深他們肝臟的問題。
- 其他較嚴重但罕見的副作用包括心律不正(不正常的心跳率)以及乳酸中毒症，它的病徵包括持續性的噁心，突發性的疲勞，嘔吐及腹痛。



- 有部分研究報告指出ATAZANAVIR較其他PI較少引起血脂(胆固醇和三酸甘油酯)不正常的水平。
- 如果出現以上的副作用，請聯絡你的醫生或藥劑師，千萬不要在與他們商討前自行停止服藥。

ATAZANAVIR可否與其他藥物一起服食？

- ATAZANAVIR會與其他的藥物產生相互作用，你應該把你所服食的處方和非處方藥物（包括維生素和中草藥）告訴你的醫生和藥劑師。
- 下面的一些常見藥物是不能同ATAZANAVIR同時服用的：
 - Crixivan (indinavir)
 - St.John's Wort (hypericum perforatum)
 - 鎮靜劑：Halcion (triazolam), Versed (midazolam)
 - 降膽固醇的藥物：Mevacor (lovastatin) , Zocor (simvastatin)
 - 止敏感藥：Hismanal (astemizole) , Seldane (terfenadine)
 - 抗生素：Rifadin (rifampin)
 - 治胃灼熱/止胃酸回流的藥物：Prevacid (lansoprazole) , Propulsid (cisapride) , Losec (omeprazole)
 - 治周期性偏頭痛的藥物：Ergomar , Cafergot
- 如果需要同時服食 ddI 或抗酸藥，應該在服食此類藥物之前兩個小時或服後一個小時服用ATAZANAVIR，如果 ATAZANAVIR同時組合其他抗愛滋病藥物服用，其他藥物的份量有可能需要加以調整。

ATAZANAVIR可否與酒精或消閑性藥物一起服用？

- 服食ATAZANAVIR期間，應該儘量避免過量飲酒，因為酒精可能會和你服食的藥物產生相互作用。千萬不要因為你想飲酒而不按時服藥。
- ATAZANAVIR和消閑性藥物會產生相互作用，如果你服食消閑性藥物，必須告知你的醫生和藥劑師，讓他們提醒你必須注意的事項。

如果我懷孕或計劃以母乳哺育我的嬰兒，可否服食ATAZANAVIR？

- ATAZANAVIR並不合適孕婦或兒童服用。
- 因為愛滋病毒可以經由哺乳傳染給嬰兒，所以感染愛滋病的孕婦不宜以母乳哺育。

服用ATAZANAVIR期間應注意的其他事項

- 約見你的醫生以便定期作血液測試，特別要檢驗肝臟和腎臟的健康。
- 確保藥物的供給不會中斷。



- ATAZANAVIR不能消滅愛滋病毒，也不能根治愛滋病。它也不能防止愛滋病的傳播，所以你必須緊記並執行預防愛滋病傳播的各種措施，例如再進行性行為時使用安全套，不可與別人共用針筒來注射藥物。

Copyright @ACAS 2001 & 2004. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese (Traditional and Simplified), Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: support@acas.org

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.