



药物资讯

ABACAVIR (Ziagen)

2003年9月修订

为什么医生要开ABACAVIR这种药给我？

- ABACAVIR (又名Ziagen) 这种药通常配合其他药物一起服食用作治疗艾滋病。
- ABACAVIR也是抗爱滋病药物Trizivir的成份药物。
- ABACAVIR属于一类名为Reverse Transcriptase Inhibitors (RTI) 的药物。它可以阻隔一种名叫“Reverse Transcriptase”的蛋白质，艾滋病病毒需要这种蛋白质才能够繁殖。故此，药物阻隔了这种蛋白质就能协助舒缓艾滋病的病情。
- 服食这种药物可以降低你体内艾滋病病毒的数量。它亦可以减低与艾滋病有关的感染的机会，从而减少艾滋病病毒对免疫系统的损害，协助你早日康复及保持身体健康。

如何正确服用这种药物？

- 这种药物的常见制品为每粒含300毫克ABACAVIR的药丸或每1毫升含20毫克ABACAVIR的药水。ABACAVIR的常用剂量为每天服食两次，每次服食300毫克。你可以空腹（肚）服食ABACAVIR又或者将ABACAVIR与食物一起服用。
- 你应该将ABACAVIR放置在室温和干燥的地方。不要将这种药物放在浴室或厨房里，因为空气中的水份会令药物失去效力。
- 此外，应该将药物放置在儿童不能拿到的地方。

如果我忘了服药怎么办？

- 应该尽快补服。但如果你记起时已距离下一次服药时间少于两小时的话，就应该按照预定的时间服食下一剂，而不可一次服用两剂，以免过量。
- 近期的研究结果指出，抗艾滋病的药物必须按照预定的时间表和剂量来服用才能产生理想的效果。若有遗漏或不按时服药，艾滋病病毒可能会对药物产生抗药性，从而降低药物的效力。

可能引起的副作用

- 大约有3%的人会因服食ABACAVIR而引致一种可以致命的过敏反应，病症就象患上感冒一样，例如：发冷和发热、肌肉和关节疼痛、感到疲倦和虚弱、恶心和呕吐、皮肤出现红疹和呼吸急速等。如果出现多于一种上述的副



作用，你应该立刻与医生或药剂师商讨。但不要在与他们商讨前自行停止服食药物。

- 其他常见的副作用包括：皮肤出现红疹、疲倦、头痛、失眠、腹泻、恶心和呕吐及肌肉疼痛等。如果出现以上的副作用，请与医生或药剂师商讨。

ABACAVIR可否与其他药物一起服食？

- ABACAVIR会和其他的药物产生化学作用。你应该把你所服食的处方和非处方药物（包括维生素和中草药）告知医生和药剂师。
- ABACAVIR会和下列的药物产生化学作用。如果你服食ABACAVIR，同期又要服食Antabuse、Parafon Forte、Chloral Hydrate和Isoniazid，请先与医生或药剂师商讨。

ABACAVIR可否与含酒精类饮料或消闲性药物一起服食？

- 如果你正在服用ABACAVIR，便应该尽量避免喝酒，因为酒精可能会提高ABACAVIR在血液中的含量而且会增加出现副作用的机会。
- ABACAVIR会和一些消闲性药物产生化学作用。如果你同时服食消闲性药物，你必须告知你的医生和药剂师，让他们提醒你必须注意的事项。

如果我怀孕或计划以母乳哺育我的婴孩，我可否服食ABACAVIR？

- 经已证实，ABACAVIR可以在怀孕期间降低传染艾滋病病毒的机会。如果你怀孕而又感染了艾滋病病毒，你可以和医生商讨应否服食ABACAVIR。
- 因为艾滋病病毒可以经由哺乳传染给婴儿，所以已感染上艾滋病病毒的妇女不宜以母乳哺育婴儿。

服用ABACAVIR期间应该注意的其他事项

- 你应该约见医生以便定期作血液测试，检查肝脏和肾脏的功能。
- 确保药物的供给不会中断。
- ABACAVIR不能消灭艾滋病病毒，也不能根治艾滋病或防止艾滋病病毒的传播。因此你必须紧记并执行预防艾滋病病毒传播的各项措施，例如：在进行性交时戴上安全套，不可与别人共用针筒来注射药物等。

Copyright @ACAS 2001 & 2004. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese (Traditional and Simplified), Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: support@acas.org

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.