



药物资讯

Nevirapine (Viramune)

2003年9月修订

为什麼医生要开NEVIRAPINE这种药给我？

- NEVIRAPINE (又名Viramune) 这种药通常配合其他药物一起服食用作治疗艾滋病病毒的感染。
- NEVIRAPINE属于一类名为Reverse Transcriptase Inhibitors (RTI) 的药物。它可以阻隔一种名叫“Reverse Transcriptase”的蛋白质，艾滋病病毒需要这种蛋白质才能够繁殖。故此，药物阻隔了这种蛋白质就能协助舒缓艾滋病的病情。
- 服食这种药物可以降低你体内艾滋病病毒的数量。它亦可以减低与艾滋病有关的感染的机会，从而减少艾滋病病毒对免疫系统的损害，协助你早日康复及保持身体健康。

如何正确服用这种药物？

- 这种药物的常见制品为每粒含200毫克NEVIRAPINE的药丸。NEVIRAPINE的常用剂量为头两个星期每天服食一次，每次服食200毫克，随后增加至每天服食两次，每次服食200毫克。这样就可以减少因服食NEVIRAPINE而出现的副作用。
- 你既可以空腹服食NEVIRAPINE也可以将NEVIRAPINE和食物一起同时服用。
- 你应该将NEVIRAPINE放置在室温和干燥的地方。
- 应该将药物放置在儿童不能拿到的地方。

如果我忘了服药怎麽办？

- 应该尽快补服。但如果你记起时已距离下一次服药时间少于两小时的话，就应该按照预定的时间服食下一剂，不可一次服用两剂，以免过量。
- 近期的研究结果指出，抗艾滋病的药物必须按照预定的时间表和剂量来服用才能产生理想的效果。若有遗漏或不按时服药，艾滋病病毒可能会对药物产生抗药性，从而降低药物的效力。

可能引起的副作用

- 在服食NEVIRAPINE的头六个星期内，最主要的副作用为皮肤出现红疹。如果你在服食NEVIRAPINE的头两个星期内皮肤出现红疹，便应该与医生或药剂师商讨，不要在与他们商讨前增加服食的剂量。



- 皮肤出现少量的红疹通常可以用一些药物加以控制，当你的身体逐渐适应NEVIRAPINE后，红疹就会消退。
- 如果出现严重红疹，加上发烧、口腔溃疡、肌肉或关节疼痛、眼睛红肿等病症，便应立即停止服药并且立刻联络医生或药剂师。
- 其他副作用包括：头痛，胃部不适和腹泻，发烧，疲倦。
- 大约有1%的人会因服食NEVIRAPINE而引致肝炎（hepatitis），这是一种严重且罕见的副作用。肝炎是一种致命的疾病，必须及早诊治。
- 如果出现以上的副作用，请与医生或药剂师商讨。千万不要在与医生或药剂师商讨前自行停止服食药物或改变服食的剂量。他们或许会提供一些有效的方法来控制因服食这种药物而引起的副作用。

NEVIRAPINE可否与其他药物一起服食？

- NEVIRAPINE会和其他的药物产生化学作用。你应该把你所服食的处方和非处方药物（包括维生素和中草药）告知医生和药剂师。
- 不能同期服用NEVIRAPINE与Rifampin这两种药物。
- NEVIRAPINE会降低Methadone和属于protease inhibitors一类抗艾滋病病毒药物（例如：saquinavir (Fortovase & Invirase)、indinavir (Crixivan)、ritonavir (Norvir)、nelfinavir (Viracept)、lopinavir (Kaletra)、amprenavir (Agenerase)）在血液内的含量。如果你服食NEVIRAPINE和以上的药物，这些药物的剂量必须作出调整。
- NEVIRAPINE会降低避孕丸的效力。如果你正在服用NEVIRAPINE期间便应该采用其他的避孕方法（例如：使用安全套）。

NEVIRAPINE可否与含酒精类饮料或消闲性药物一起服食？

- 如果你正在服用抗艾滋病病毒药物，便应该尽量避免饮过量的酒和服食过量的消闲性药物。
- 酒精可能会和你所服用的药物产生化学作用。千万不要因为你想饮酒而不按时服药。

如果我怀孕或计划以母乳哺育我的婴孩，我可否服食NEVIRAPINE？

- 如果你怀孕又希望服食NEVIRAPINE，便应该和医生商讨。
- 因为艾滋病病毒可以经由哺乳传染给婴儿，所以已感染艾滋病病毒的妇女不宜以母乳哺育婴儿。



服用NEVIRAPINE期间应该注意的其他事项

- NEVIRAPINE会影响肝脏的功能，甚至会引致肝炎。你应该约见医生以便定期作血液测试，检查肝脏的功能。
- 确保药物的供给不会中断。
- NEVIRAPINE不能消灭艾滋病病毒，也不能根治艾滋病或防止艾滋病病毒的传播。所以你必须牢记并执行预防艾滋病病毒传播的各项措施，例如：在进行性交时戴上安全套，不可与别人共用针筒来注射药物等。

Copyright @ACAS 2001 & 2004. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese (Traditional and Simplified), Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: support@acas.org

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.