



药物资讯

TRIZIVIR (Zidovudine + Lamivudine + Abacavir)

为什么医生要开TRIZIVIR 这种药给我？

- TRIZIVIR是由三种抗艾滋病毒的药物所组成，包括 Abacavir(Ziagen), Lamivudine(3TC)及Zidovudine(AZT)。它可以单独服用或者配合其他药物来治疗艾滋病。
- 这三种组成TRIZIVIR的药物同属于称为Reverse Transcriptase Inhibitors (RTI) 的药物，它可以阻隔一种名叫“Reverse Transcriptase”的蛋白质，艾滋病毒需要这种蛋白质才能够繁殖。因此阻隔了这种蛋白质就能协助舒缓艾滋病的病情。
- 服用这种药物可以降低人体内艾滋病毒的数量及减低与艾滋病有关感染的机会，从而减低病毒对免疫系统的损害，协助你早日你康复及保持身体健康。

如何正确服用这种药物？

- 每粒片剂TRIZIVIR含有300毫克Abacavir, 300毫克AZT及150毫克3TC。常用量为每日服用两次，每次一粒。
- TRIZIVIR可以空腹服食也可以同食物一起服用。
- TRIZIVIR应存放在室温并且干燥的地方，不要放在浴室或厨房里，因为空气中的水份会令药物失去效力。
- 药物应存放在儿童不能拿到的地方。

如果我忘了服药怎么办？

- 应该尽快补服，但若距离下一次服药时间少于两小时，就应按照预定的时间服食下一剂，不可一次服用两剂，以免过量。
- 近期的研究结果指出，抗艾滋病的药物必须按照预定的时间表和剂量才能产生理想的效果，若遗漏或者不按时服药，病毒会对药物产生抗药性，以致药物失去效力。



可能引起的副作用

- 它可能包括成份的其中一种或三种药物的副作用 (Abacavir, 3TC, 或 AZT) 最常见的副作用
 - 头痛和发烧
 - 肠胃不适, 恶心, 呕吐, 腹泻
 - 疲倦
 - 食欲不振
 - 失眠
 - 脱发, 或指甲色素沉淀
- 最严重的副作用是大约有3%的人服食TRIZIVIR后会引致一种可能致命的过敏反应, 它是由于药物中的Abacavir所引起, 病症包括发冷和发热, 肌肉和关节疼痛, 感到疲倦和虚弱, 恶心和呕吐, 皮肤出现红疹和呼吸急速等, 如果有出现上述任两种或更多的症状, 要立即与医生或药剂师联络, 在未与有关医务人员商讨前勿自行停止服药。
- 有极少数的例子里, TRIZIVIR可能引致白血球的减少(这会增加感染疾病的危险)和红细胞不足(这会令你疲倦及气促)。

TRIZIVIR可否与其他药物一起服食

- TRIZIVIR和其他药物会产生化学作用, 你应该把你所服食的处方和非处方药物(包括维生素和中草药)告知医生和药剂师。
- 避免同期服用的药物有D4T (Zerit, Stavudine) 和 Ribavirin (Virazid), 其他需要调整剂量(或份量)的药物包括 Methadone, Ganciclovir, Valganciclovir, Isoniazid, Antabuse 和 Chloral Hydrate. 如果你在服食TRIZIVIR的同期要服食以上药物, 请先与医生商讨。

TRIZIVIR可否与酒精类饮料或者消闲性药物一起服食

- 酒精会增加TRIZIVIR内Abacavir的副作用, 服药期间, 应避免喝酒, 消闲性药物亦会和TRIZIVIR产生化学作用, 如果你服食软性毒品, 必须先告知你的医生或药剂师, 让他们提醒你必须注意的事项。

如果我怀孕或计划以母乳哺育我的婴孩, 可否服食TRIZIVIR?

- 孕妇有意服食TRIZIVIR前, 请先与医生商讨。
- 由于艾滋病毒可以经由哺乳传染给婴儿, 所以已感染上艾滋病毒的妇女不宜以母乳哺育婴儿。



服用TRIZIVIR期间应该注意的其他事项

- 定期约见医生作血液测试，检查肝脏和肾脏的功能。
- 确保药物的供给不会中断
- TRIZIVIR不能完全消灭艾滋病病毒，也不能根治艾滋病，或防止艾滋病病毒的传播。因此你必须牢记并执行预防艾滋病病毒传播的各项措施，例如：
：在进行性交时戴上安全套，不可与别人共用针筒来注射药物等。

Copyright @ACAS 2001 &2003. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese, Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: support@acas.org

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.