



药物资讯

ATAZANAVIR (Reyataz)

为什么医生处方ATAZANAVIR这种药物给我？

- ATAZANAVIR这种药物通常是与其他药物组合起来服用的，用来医治爱滋病的感染。
- ATAZANAVIR属于名为 PROTEASE INHIBITOR (PI) 类型的药物，他可以阻隔一种名为“PROTEASE”的蛋白质，爱滋病毒需要这种蛋白质才能够繁殖。故此，药物阻隔了这种蛋白质就有助于舒缓爱滋病的病情。
- 服食这种药物可以降低你身体内的爱滋病毒的数量，也可以减低与爱滋病有关的感染的机会，帮助你康复及保持身体健康，这种药物也可以减少爱滋病毒对免疫系统的损害。

如何正确服用这种药物？

- ATAZANAVIR为150 毫克及200毫克的胶囊。
- 如果ATAZANAVIR作为唯一的 PROTEASE INHIBITOR药物，其常用剂量为 400毫克(2 X 200毫克胶囊)，每天服食一次。它也可以组合其他PI 的药物一起服食，通常是 RITONAVIR，服用量为 ATAZANAVIR 300毫克，RITONAVIR 100 毫克，每天服食一次。
- ATAZANAVIR应与食物一起服食。
- ATAZANAVIR存放在室温和干爽的地方，不要将药物存放在浴室或厨房，因为空气中的水分会令药物失去效力。
- 将药物存放在儿童不能拿到的地方。

如果我忘记了服药怎么办？

- 应该尽快补服，但若发觉时距离下一次服药时间少于两小时的话，就应该按照预定的时间服食下一剂，不可一次服用两剂，以免过量。
- 近期研究结果指出，抗爱滋病的药物必须严加执行按照规定的时间表和剂量内服用才能产生理想的效果。如果忘记或不按时服药，爱滋病毒可能会对药物产生抵抗力，从而降低药物的效力。

可能引起的副作用：

- 最常见的副作用包括头痛，恶心，红斑，腹痛及皮肤或眼白发黄(黄疸病)。
- 患有乙型或丙型肝炎的患者由可能会加深他们肝脏的问题。
- 其他较严重但罕见的副作用包括心律不正(不正常的心跳率)以及乳酸中毒症，它的病徵包括持续性的恶心，突发性的疲劳，呕吐及腹痛。



- 有部分研究报告指出ATAZANAVIR较其他PI较少引起血脂(胆固醇和三酸甘油酯)不正常的水平。
- 如果出现以上的副作用，请联络你的医生或药剂师，千万不要在与他们商讨前自行停止服药。

ATAZANAVIR可否与其他药物一起服食？

- ATAZANAVIR会与其他药物产生相互作用，你应该把你所服食的处方和非处方药物（包括维生素和中草药）告诉你的医生和药剂师。
- 下面的一些常见药物是不能同ATAZANAVIR同时服用的：
 - Crixivan (indinavir)
 - St. John's Wort (hypericum perforatum)
 - 镇静剂：Halcion (triazolam), Versed (midazolam)
 - 降胆固醇的药物：Mevacor (lovastatin), Zocor (simvastatin)
 - 止敏感药：Hismanal (astemizole), Seldane (terfenadine)
 - 抗生素：Rifadin (rifampin)
 - 治胃灼热/止胃酸回流的药物：Prevacid (lansoprazole), Propulsid (cisapride), Losec (omeprazole)
 - 治周期性偏头痛的药物：Ergomar, Cafergot
- 如果需要同时服食 ddI 或抗酸药，应该在服食此类药物之前两个小时或服后一个小时服用ATAZANAVIR，如果 ATAZANAVIR同时组合其他抗爱滋病药物服用，其他药物的份量有可能需要加以调整。

ATAZANAVIR可否与酒精或消闲性药物一起服用？

- 服食ATAZANAVIR期间，应该尽量避免过量饮酒，因为酒精可能会和你服食的药物产生相互作用。千万不要因为你想饮酒而不按时服药。
- ATAZANAVIR和消闲性药物会产生相互作用，如果你服食消闲性药物，必须告知你的医生和药剂师，让他们提醒你必须注意的事项。

如果我怀孕或计划以母乳哺育我的婴儿，可否服食ATAZANAVIR？

- ATAZANAVIR并不合适孕妇或儿童服用。
- 因为爱滋病毒可以经由哺乳传染给婴儿，所以感染爱滋病的孕妇不宜以母乳哺育。

服用ATAZANAVIR期间应注意的其他事项

- 约见你的医生以便定期作血液测试，特别要检验肝脏和肾脏的健康。
- 确保药物的供给不会中断。



- ATAZANAVIR不能消灭爱滋病毒，也不能根治爱滋病。它也不能防止爱滋病的传播，所以你必须紧记并执行预防爱滋病传播的各种措施，例如进行性行为时使用安全套，不可与别人共用针筒来注射药物。

Copyright @ACAS 2001 & 2004. This fact sheet is produced by ACAS (Asian Community AIDS Services) and is available in English, Chinese (Traditional and Simplified), Tagalog and Vietnamese. Funding for this project is provided by the Ontario HIV Treatment Network (OHTN) and Health Canada. Copies can be downloaded at : www.acas.org/treatment. ACAS provides comprehensive support and case management services for Asian people living with HIV/AIDS; and HIV/AIDS prevention education to the east and southeast Asian Canadian populations in the Greater Toronto Area. ACAS is located at 33 Isabella Street, Suite 107, Toronto, Ontario M4Y 2P7. Tel: (416)-963-4300, Fax: (416)-963-4371 Email: support@acas.org

Legal Disclaimer: While we make every attempt to ensure the accuracy and reliability of information contained in this website/ fact sheet, the information provided here are designed for reference purposes only. These information should not be relied upon as a substitute for medical advice from a qualified professional health care provider and should not be used for diagnosing or treating a condition or illness. Please consult a physician if you have any concerns about your health, treatment regimen and questions related to HIV/AIDS. ACAS, its employees and board members will not be responsible for any loss or harm, however arising, from the use of, or reliance on this information.